



Profilassi dell'endocardite infettiva Pazienti a rischio intermedio

Norme generiche:

1. Scrupolosa osservanza dell'igiene orale.
2. Accurata bonifica di eventuali foci settici del cavo orale e di altri distretti.

A. In caso di interventi diagnostici o terapeutici:

1. Interventi odontoiatrici (avulsioni dentarie, ma anche pulitura o altre manovre che provochino sanguinamenti)
 2. Adenoidectomia
 3. Tonsillectomia
- **Augmentin** 2 c. da 1 gr. insieme un'ora prima della procedura (bambini 50 mg/Kg)
 - Se il paziente non è in grado di assumere farmaci per os: **Unasyn** 2 gr. (bambini 50 mg./Kg) i. v. entro ½ o 1 ora prima della procedura.
 - Se il paziente è allergico alla Penicillina: **Claritromicina** 1 c. da 500 mg. (bambini 15 mg./Kg) un'ora prima della procedura.

B. Interventi sul tratto gastroenterico o su quello genito-urinario (cateterismo uretrale, chirurgia genito-urinarie, chirurgia della colecisti o del digerente, parto, revisione di cavità, aborto, impianto di dispositivi intrauterini etc.)

- **Unasyn** 2 gr. in vena (bambini 50mg/Kg) da ½ ora a 1 ora prima dell'intervento; oppure **Augmentin** 2 g. per os un'ora prima della procedura.
- Se il paziente è allergico alla penicillina, **Vancomicina** 1 g. (bambini 20 mg/Kg) in 1-2 ore entro 30' prima della procedura.

Profilassi dell'endocardite infettiva Pazienti ad alto rischio

Norme generiche:

1. Scrupolosa osservanza dell'igiene orale.
2. Accurata bonifica di eventuali foci settici del cavo orale e di altri distretti.

A. In caso di interventi diagnostici o terapeutici:

1. Interventi odontoiatrici (avulsioni dentarie, ma anche pulitura o altre manovre che provochino sanguinamenti)
 2. Adenoidectomia
 3. Tonsillectomia
- **Augmentin** 2 c. da 1 gr. insieme un'ora prima della procedura (bambini 50 mg/Kg).
 - Se il paziente non è in grado di assumere farmaci per os: **Unasyn** 2 gr. (bambini 50 mg./Kg) i. v. entro ½ o 1 ora prima della procedura.
 - Se il paziente è allergico alla Penicillina: **Claritromicina** 1 c. da 500 mg. (bambini 15 mg./Kg) un'ora prima della procedura.

B. Interventi sul tratto gastroenterico o su quello genito-urinario (cateterismo uretrale, chirurgia genito-urinarie, chirurgia della colecisti o del digerente, parto, revisione di cavità, aborto, impianto di dispositivi intrauterini etc.)

- **Unasyn** 2 gr. in vena (bambini 50mg/Kg) + **Gentalyn** 1,5 mg/Kg di peso (non più di 80 mg.) corporeo in muscolo o in vena da ½ ora a 1 ora prima dell'intervento; dopo 6 ore **Augmentin** 1 g. per os.
- Se il paziente è allergico alla penicillina, **Vancomicina** 1 g. (bambini 20 mg/Kg) in 1-2 ore entro 30' prima della procedura + **Gentalyn** 1,5 mg/Kg (non più di 80 mg.) in muscolo o in vena.